

Pakningsvedlegg

Combizym

Dersom du har fått legemidlet på resept, vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.

Introduksjon (legemidlets navn og legemiddelform):

Legemidlets navn: Combizym

Legemiddelform: Tabletter

Innhold (deklarasjon)

1 tablett inneholder:

Enzymkonsentrat av *Aspergillus oryzae* (fordøyelsesenzym):

Protease	10	FIP*-Enheter
Cellulase	70	FIP-Enheter
Amylase	170	FIP-Enheter

Pankreatin (fordøyelsesenzym):

Lipase	7400	Ph.Eur.-Enheter
Protease	420	Ph.Eur.-Enheter
Amylase	7000	Ph.Eur.-Enheter

Fargestoff: Titandioksid (E 171)

Tablettene inneholder også andre hjelpestoffer. Sukkerholdig.

*Fédération Internationale Pharmaceutique (1974)

Virkemåte

Combizym tabletter inneholder fordøyelsesenzymmer. Tabletten består av et ytterlag som løses i maven og et indre lag som løses i tarmen. Enzymene spalter eggevitestoffer, karbohydrater og fett.

Innehaver av markedsføringstillatelsen / tilvirker

Daiichi Sankyo Europe GmbH, München, Tyskland.

Representant i Norge:

Weifa AS, Postboks 9113 Grønland, 0133 Oslo.

Bruksområder (indikasjoner)

Combizym tabletter inneholder fordøyelsesenzymmer, og brukes ved fordøyelsesbesvær som skyldes nedsatt produksjon av fordøyelsesenzymmer i bukspyttkjertelen.

Tilstander hvor legemidlet ikke skal brukes (kontraindikasjoner)

Combizym bør ikke brukes ved overfølsomhet (allergi) til en eller flere av

innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Tablettene skal svelges hele. Det laget i tablettene som skal løses i tarmen ødelegges hvis tablettene deles eller tygges. Dersom tablettene tygges og holdes i munnen en stund kan det oppstå skader i munnslimhinnen.

Graviditet

Ingen uheldig effekt på fosteret vist.

Amming

Går ikke over i morsmelk.

Dosering

1-3 tabletter svelges hele under eller etter måltidet. Om nødvendig kan dosen økes.

Forholdsregler ved for høy dose

Kontakt alltid lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

Bivirkninger

Ingen kjente bivirkninger.

Oppbevaring og holdbarhet

Combizym tabletter oppbevares i romtemperatur og er holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Øvrig informasjon

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert: Oktober 2006.