

# Pakningsvedlegg

## Fanalgin "Weifa"

***Dersom du har fått legemidlet på resept, vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.***

### **Introduksjon (legemidlets navn og legemiddelform)**

Legemidlets navn: Fanalgin "Weifa"

Legemiddelform: Tabletter med delestrek.

### **Innhold (deklarasjon)**

1 tablett inneholder: Fenazon 500 mg, koffein 50 mg, maisstivelse, crospovidon, sorbitol, polyvidon, mikrokrytalinsk cellulose, silikondioksyd, stearinsyre.

### **Virkemåte**

Fanalgin har smertestillende og febernedssettende effekt.

### **Innehaver av markedsføringstillatelsen / tilvirker**

Weifa AS, Postboks 9113 Grønland, 0133 Oslo.

### **Bruksområder (indikasjoner)**

Hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter.

### **Tilstander hvor legemidlet ikke skal brukes (kontraindikasjoner)**

Fanalgin skal ikke brukes hvis du har sår i mave-tarmkanalen. Heller ikke hvis du får allergisk reaksjon av innholdsstoffene i Fanalgin.

### **Forsiktighetsregler**

- Fanalgin må brukes med forsiktighet hvis du tidligere har hatt mavesår, hvis du er plaget med for mye mavesyre, eller har andre plager i mave-tarmkanalen. Fanalgin må også brukes ved forsiktighet hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon. Lang tids bruk av store doser Fanalgin kan medføre risiko for nyreskade. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Fanalgin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Fanalgin bør lege kontaktes.

## **Graviditet**

Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Fanalgin tabletter under graviditet.

## **Amming**

Fanalgin går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig ved angitte dosering. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Fanalgin under amming.

## **Trafikkadvarsel**

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Fanalgin påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

## **Forsiktighet ved annet samtidig inntak av legemidler og annet**

Fanalgin kan påvirke effekten av andre legemidler. Fanalgin kan gi nedsatt effekt av bl.a. midler mot blodpropp. Rådfør deg med legen eller apoteket.

## **Dosering**

1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet. Hvis du har vært i kontakt med lege skal du følge legens anvisning.

## **Forholdsregler ved for høy dose**

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

## **Bivirkninger**

Allergiske reaksjoner kan forekomme. Vanligst er hudutslett. Alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner er sett (sjeldent). Koffein øker dannelsen av mavesaft. Kan i store doser gi blant annet søvnløshet, uro, skjelvinger, hjertebank, hodepine og kvalme. Vedvarende bruk av store doser kan forårsake hodepine når behandlingen avbrytes.

Kontakt lege ved uventede og/eller plagsomme bivirkninger.

## **Oppbevaring og holdbarhet**

Tablettene må oppbevares utilgjengelig for barn.

Fanalgin tabletter skal oppbevares ved normal romtemperatur på et tørt sted. De er holdbare til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

## **Øvrig informasjon**

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert: 2006-06-22