

PAKNINGSVEDLEGG

Ibux gel 5%

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Ibux gel brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Ibux gel er og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ibux gel
3. Hvordan du bruker Ibux gel
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel
6. Ytterligere informasjon

1. Hva Ibux gel er og hva det brukes mot

Ibux gel inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes.

Ibux gel brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Ibux gel kan også forskrives av lege ved milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ibux gel

Bruk ikke Ibux gel

- dersom du er overfølsom for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler
- på områder der huden er skadet, for eksempel ved eksem, akne eller åpne sår
- hvis du er mer enn 6 måneder gravid

Vis forsiktighet ved bruk av Ibux gel

- dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Rådfør deg med lege før bruk.
- dersom du har astma. Rådfør deg med lege før bruk.
- dersom du får utslett skal behandlingen avsluttes

Unngå å få gelen på slimhinner eller i øynene.

Bruk av andre legemidler sammen med Ibux gel

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmidler.

Graviditet og amming

Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det. Som for andre legemidler som inneholder acetylsalicylsyre eller andre ikke-steroid antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.

Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux ved amming. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

3. Hvordan du bruker Ibux gel

Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt legen eller apoteket dersom du er usikker på doseringen.

Dosering: Voksne og barn over 12 år: Ibux gel smøres på det smertefulle området inntil 3 ganger daglig. Gelen masseres inn i huden noen minutter. Du bør ikke bruke mer enn 15 gram gel per dag. Det tilsvarer ca. 30 cm gelstrek. Vask hendene etter påsmøring. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.

Dersom du tar for mye av Ibux gel

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis barn eller andre har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Ibux gel forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger (hos mer enn en av hundre pasienter) er rødhet, irritasjon og kløe på huden der gelen er påført.

Sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av tusen pasienter) er magesmerter.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker andre bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Ibux gel etter utløpsdatoen angitt på pakningen. Oppbevares ved høyst 30°C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux gel:

Virkestoff i 1g gel: Ibuprofen 50 mg

Hjelpestoffer er: Hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, isopropanol, natriumhydroksid og rensset vann.

Hvordan Ibox gel ser ut og innholdet i pakningen

Gjennomsiktig gel.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Weifa AS, Hausmannsgate 6, P.O. Box 9113 Grønland, NO-0133 Oslo

Tlf.: 22 99 86 00, E-mail: weifa@weifa.no

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 15.10.2009