

PAKNINGSVEDLEGG

Nazaren nesenspray, oppløsning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nazaren nesenspray brukes som anbefalt for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever at noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Nazaren nesenspray er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Nazaren nesenspray
3. Hvordan du bruker Nazaren nesenspray
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Nazaren nesenspray
6. Ytterligere informasjon

1. HVA NAZAREN ER OG HVA DET BRUKES MOT

Nazaren virker på blodårene i nesen slik at disse trekker seg sammen og letter luftpassasjen.

Nazaren brukes lokalt i nesen for å lette luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse. Legen kan også forskrive Nazaren ved bihulebetennelse og akutt mellomørebetennelse.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER NAZAREN

Bruk ikke Nazaren

- dersom du er allergisk (overfølsom) overfor xylometazolin eller et av de andre innholdsstoffene i Nazaren.
- til barn under 2 år
- ved noen typer operasjoner. Husk å spørre legen om det.
- ved andre typer betennelsetilstander i hud og slimhinner i nesehulen enn forkjølelse og lignende, og ved skorpedannelser (rhinitis sicca).
- ved en bestemt type glaukom (grønn stær).

Vis forsiktighet ved bruk av Nazaren

- Nazaren bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn og 10 sammenhengende dager hos voksne. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet ("rebound" effekt).
- ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.
- dersom du har høyt blodtrykk eller hjerte- karsykdom.
- dersom du har sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

Bruk av andre legemidler sammen med Nazaren

Rådfør deg med lege før samtidig bruk av visse legemidler mot depresjon (MAO-hemmere). Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmidler.

Graviditet og amming

Brukes med forsiktighet av gravide. Unngå høye doser og hyppig bruk. Bruk av anbefalte doser medfører ingen risiko for fosteret. Virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Kan benyttes under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. HVORDAN DU BRUKER NAZAREN

Voksne og barn over 10 år:

Nazaren 1 mg/ml: En spray i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Nazaren bør ikke brukes i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne.

Barn 2-10 år:

Saltvannsuppløsning bør være prøvd før behandling med Nazaren startes.

Nazaren 0,5 mg/ml: En spray i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Nazaren bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn.

Nazaren skal ikke brukes av barn under 2 år.

Bruksanvisning

1. Puss nesen
2. Ta av plasthetten
3. Plasser flasken med spissen mellom fingrene



4. Før sprøyen tas i bruk første gang pumpes et par ganger til oppløsningen kommer ut som en fin tåke
5. Plasser spissen på sprøyen forsiktig i neseboret og spray en gang i hvert nesebor.

Dersom du tar for mye av Nazaren

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Nazaren forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger (hos mer enn en av hundre pasienter) er brennende følelse i nese eller hals eller tørrhet i neselimhinnen. Mindre vanlige bivirkninger (hos mindre enn en av hundre pasienter) er lokal irritasjon i nese og svelg. Sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av tusen pasienter) er kvalme og hodepine. Meget sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av ti tusen pasienter) er allergireaksjoner, nervøsitet, søvnforstyrrelser, forbigående synsforstyrrelser og hjertekareffekter.

Bruk over lengre tid kan føre til at nesen blir tett igjen. Dette kan unngås ved ikke å bruke produktet lenger enn anbefalt (se pkt. 3).

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker andre bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER NAZAREN

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30°C.
Bruk ikke Nazaren etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.


6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Nazaren nesespray, oppløsning

Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml resp. 1,0 mg/ml

Hjelpestoffer er: Natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, natriumklorid og rensset vann

Hvordan Nazaren nesespray, oppløsning ser ut og innholdet i pakningen



En enveis vakuumpumpe hindrer at luften strømmer tilbake i flasken etter bruk. Dette er grunnen til at det ikke er nødvendig med konserveringsmidler. Comod® 360° spraysystem gjør at pumpen fungerer i alle vinkler.

Innehaver i markedsføringstillatelse og tilvirker

Weifa AS

Postboks 9113, Grønland

0133 Oslo

weifa@weifa.no

Tlf: +47 22 99 86 00

www.weifa.no

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent:

2009-01-30