

PAKNINGSVEDLEGG

Samin 625 mg tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Likevel må Samin tabletter brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 4 uker.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Samin er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Samin
3. Hvordan du bruker Samin
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av Samin
6. Ytterligere informasjon

1. Hva Samin er, og hva det brukes mot

Glukosamin er en kroppsegen substans som dannes av glukose (en sukkerart). Glukosamin er nødvendig for at kroppen skal danne større molekyler som finnes bl.a. i leddvæske og brusk.

Samin brukes for å lindre symptomene ved lett til moderat slitasjegikt (artrose).

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Samin

Bruk ikke Samin

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor glukosamin eller et av de andre innholdstoffene i Samin.
- hvis du er allergisk mot skalldyr, siden virkestoffet, glukosamin, utvinnes fra skalldyr.

Vis forsiktighet ved bruk av Samin

- Du bør rådføre deg med lege før behandling med Samin for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
- Diabetikere og personer med nedsatt glukosetoleranse bør rådføre seg med en lege før bruk av Samin og blodsukkerverdiene bør kontrolleres oftere i begynnelsen av behandlingen.
- Personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Samin, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.
- Samin bør ikke brukes av personer under 18 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Samin

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av enkelte blodfortynnende midler (warfarin). Personer som bruker blodfortynnende midler skal derfor ha oppfølging av lege ved oppstart og avslutning av behandling med Samin.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det foreligger ikke tilstrekkelig data på bruk av Samin hos gravide kvinner. Det er ukjent om Samin går over i morsmelk, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Samin skal derfor ikke brukes under amming og graviditet.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofyllt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofyllt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Samin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdstoffene i Samin

Ingen spesielle opplysninger.

3. Hvordan du bruker Samin

Hvis du har vært i kontakt med lege skal du følge legens anvisning. Kontakt lege eller apotek om du er usikker. Lege bør oppsøkes før behandlingen startes for å utrede om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene.

Vanlig startdose er 1 tablett 2 ganger daglig. Etter symptomlindring kan dosen senkes til 1 tablett pr. dag. Tablettene bør svelges med væske.

Lindring av symptomer (særlig smertelindring) inntreer vanligvis innen 4 uker etter behandlingens start. Hvis symptomene ikke er bedret etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.

Hvis du mener virkningen av Samin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Dersom du tar for mye Samin

Kontakt lege, sykehus eller giftinformasjonen (tlf. 22591300) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Symptomer på overdosering kan være hodepine, svimmelhet, forvirring, leddsmerter, kvalme, brekninger, diaré eller forstoppelse. Avbryt behandlingen ved tegn på overdosering.

Dersom du har glemt å ta Samin

Dersom du har glemt å ta Samin må du ikke ta dobbel dose for å erstatte den du glemte. Fortsett behandlingen som anbefalt.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Samin ha bivirkninger, men ikke alle får det.

Følgende bivirkninger er rapportert:

Vanlige (færre enn 1 av 10 pasienter, men flere enn 1 av 100 pasienter):

Hodepine, tretthet, kvalme, mageplager, diaré, forstoppelse.

Mindre vanlige (færre enn 1 av 100 pasienter, men flere enn 1 av 1.000 pasienter):

Utslett, kløe, rødme.

Ukjent frekvens:

Svimmelhet, oppkast, oppsvulming av ansikt, tunge eller svelg (angioødem), elveblest, oppsvulming av ankler, ben og føtter. Ved oppsvulming av ansikt, tunge eller svelg må behandlingen avbrytes og lege kontaktes.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Oppbevaring av Samin

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30°C.

Bruk ikke Samin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Samin:

- Virkestoff er: Glukosaminhydroklorid tilsvarende glukosamin 625 mg
- Andre innholdsstoffer er: Hydroksypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Hvordan Samin ser ut:

Samin tabletter er hvite, avlange tabletter med delestrek, pakket i blister eller boks.

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker:

Weifa AS
Hausmannsgt. 6
Postboks 9113 Grønland
NO-0133 Oslo
Tlf: 22998600
e-mail: weifa@weifa.no

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 2010-07-06