

# PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

**Tussin 20 mg/ml mikstur, oppløsning**  
**Tussin 20 mg/ml mikstur, oppløsning, med fruktsmak**

guaifenesin

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.**

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Tussin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Tussin er og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Tussin
3. Hvordan du bruker Tussin
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Tussin
6. Ytterligere informasjon

## 1. HVA TUSSIN ER OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning angitt på apoteketiketten.

- Tussin inneholder virkestoffet guaifenesin som letter opphostingen av seigt slim ved å gjøre slimet mer tyntflytende.
- Bruksområde: Hoste og seigt slim ved irritasjon i øvre luftveier.

## 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER TUSSIN

### **Bruk ikke Tussin**

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor guaifenesin eller et av de andre innholdsstoffene i Tussin.

### **Vis forsiktighet ved bruk av Tussin**

Ingen kjente forsiktighetsregler.

### **Bruk av andre legemidler sammen med Tussin.**

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

### **Inntak av Tussin sammen med mat og drikke**

Tussin kan tas uavhengig av måltider.

### **Graviditet og amming**

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Lang erfaring ved bruk av Tussin under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege eller apotek før bruk av Tussin dersom du er gravid.

Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege eller apotek før bruk av Tussin ved amming.

### **Kjøring og bruk av maskiner**

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

### **Viktige opplysninger om noen av innholdstoffene i Tussin:**

Dette legemidlet inneholder sorbitol (E420). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

## **3. HVORDAN DU BRUKER TUSSIN**

Hvis du har vært i kontakt med lege skal du følge legens anvisning. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.

Vanlig dosering:

*Voksne:* 1 barneskje (10 ml) 3-5 ganger daglig.

*Barn :*

*6-12 år:* 1 barneskje (10 ml) 2-3 ganger daglig.

*1-5 år:* 1 teskje (5 ml) 2-3 ganger daglig.

*Barn under 1 år:* ½ teskje (2,5 ml) 2-3 ganger daglig.

### **Dersom du tar for mye av Tussin**

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

### **Dersom du har glemt å ta Tussin**

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

## **4. MULIGE BIVIRKNINGER**

Som alle legemidler kan Tussin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Den vanligste bivirkningen er lettere mavebesvær. Overdosering kan gi kvalme og oppkast.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

## **5. HVORDAN DU OPPBEVARER TUSSIN**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tussin skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Bruk ikke Tussin etter utløpsdatoen som er angitt på flasken.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

## **6. YTTERLIGERE INFORMASJON**

### **Sammensetning av Tussin**

- Virkestoff er: Guaifenesin 20 mg/ml
- Andre innholdsstoffer er: Sorbitol, flytende (ikke-krystalliserende, E420), glyserol 85 %, makrogolglyserolhydroksystearat, karmellosenatrium, sitronsyre, kaliumsorbat (E202), neohesperidindihydrokalkon, 30 % simetikonemulsjon, sukralose, glyseroltriacetat,  $\alpha$ - tokoferol, rensset vann, fruktaroma (Tussin med fruktsmak) eller lakrissekstrakt, ammoniumklorid og anisolje (Tussin med lakrissmak).

### **Hvordan Tussin ser ut og innholdet i pakningen**

Tussin finnes i to varianter; lakrissmak og fruktsmak. Tussin med lakrissmak er en brun mikstur, mens Tussin med fruktsmak er en fargeløs mikstur. Flasken inneholder 100 eller 300 ml mikstur. Flasken må omrystes før bruk.

### **Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:**

Weifa AS  
Hausmannsgate 6  
P.O. Box 9113 Grønland  
NO-0133 Oslo  
Tlf.: 22 99 86 00  
Fax: 22 99 86 01  
E-mail: weifa@weifa.no

**Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 2010-12-20**